

**VIO****MADE IN GERMANY**

Лебозол[®] - Кальций

раствор

CaO, оксид кальция (220 г/л) – 16,7 %

Плотность: 1,32 кг/л

Показатель pH: 7,5

17

продукты

Культура	Цель	Рекомендации	Сроки
Все культуры	Обеспечение кальцием	1-5 л/га	При необходимости. Расход рабочей жидкости не менее 500 л/га. При использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего раствора 1 %.
Семечковые плодовые	Крепость плодов, стабильность хранения, устойчивость к внешнему воздействию	4-6 раз 2-5 л/га	с интервалом 10-14 дней между периодом окончания цветения и за 15 дней до начала сбора урожая
Косточковые плодовые	Твердость плодов, стабильность хранения	2-5 раз 2-5 л/га	между периодом завязи плодов и за 10-14 дней до начала сбора урожая
Ягодные	Крепость ягод, стабильность хранения	3-4 раза 2-5 л/га	между периодом завязи ягод и за 10-14 дней до начала сбора урожая
Столовый, технический виноград	Крепость ягод, стабильность хранения, устойчивость к внешнему воздействию	3 раза 3-5 л/га	при достижении размера ягод с горошину и до начала сбора урожая
Овощные	Предотвращение гниения плодов, стабильность хранения	3-4 раза 1-3 л/га	с момента окончания цветения и начала процесса плодообразования
Овощные корнеплоды	Твердость корнеплодов, стабильность хранения	3-4 раза 2-5 л/га	при формировании достаточной площади листьев
Картофель	Качество клубня и кожуры, улучшение лежкости	2-3 раза 1-3 л/га	с начала смыкания рядков

