



MADE IN GERMANY

16

продукты

Лебозол®-Калий 450

раствор

N, амидный азот (45 г/л) – 3 %
K₂O, оксид калия (450 г/л) – 30 %

Плотность: 1,50 кг/л
Показатель pH: 14,0

Культура	Цель	Рекомендации	Сроки
Все культуры	Обеспечение калием	1-5 л/га	При необходимости. Расход рабочего раствора не менее 300 л/га. При использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего раствора 2 % (лучший эффект в сочетании с 1-2 л/га Аминозол®)
	Урожайность, улучшение водного баланса, повышение устойчивости цветков к заморозкам	1-2 раза 1-3 л/га	
Картофель	Урожайность, снижение восприимчивости к синей/черной пятнистости,	2-4 раза 1-3 л/га	с момента образования клубней и после цветения
Сахарная свекла	Урожайность, эффективность азота, увеличение содержания сахара, жизнеспособность	2-3 раза 2-5 л/га	с фазы 8-го листа
Овощные	Урожайность, срок хранения, качество хранения	2-4 раза 3-5 л/га	при формировании достаточной площади листьев
Столовый, технический виноград	Вызревание лозы, зимостойкость, образование сахара	1-2 раза 3-5 л/га	в период от начала окончания цветения и за 10-14 дней до начала уборки урожая
Земляника садовая	Урожайность, твердость плода, размер плода, "сладость" ягоды (накопление сахара)	2-3 раза 2-5 л/га	в период между завязью плода и началом сбора ягод
Семечковые плодовые	Твердость плода, размер, плода, красная окраска, накопление сахара	2-4 раза 3-5 л/га	между периодом опадения завязи в июне и за 10-14 дней до начала съема плодов
Косточковые плодовые	Твердость плода, размер плода, накопление сахара	2-3 раза 3-5 л/га	между завязью плода и за 10-14 дней до начала съема плодов