



Лебозол[®]-Сера 800 СП

суспензия

S, элементарная сера (800 г/л) – 56 %

Плотность: 1,43 кг/л

Показатель pH: 6,0–8,0

45

продукты

Культура	Цель	Рекомендации	Сроки
Все культуры	Устранение дефицита серы	1-5 л/га	При необходимости. Расход рабочей жидкости не менее 300 л/га. При использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего раствора 0,2-0,1 %.
Зерновые	Урожайность, эффективность азота, сопротивляемость болезням	1-2 раза 1-3 л/га	с начала кущения
	Урожайность, эффективность азота, содержание белка, качество зерна	1-2 раза 1-3 л/га	с фазы начала колошения
Картофель	Урожайность, эффективность азота, сопротивляемость болезням	1-2 раза 1-3 л/га	с начала смыкания рядков
Бобовые (в т.ч. соя)	Урожайность, содержание белка	1-2 раза 1-3 л/га	с фазы 6-го листа
Кукуруза	Эффективность азота, сопротивляемость болезням	1-2 раза 1-3 л/га	с фазы 4-го листа
Рапс	Урожайность, цветение, содержание масла	1-2 раза 1-3 л/га	с фазы 6-го листа до начала цветения
Сахарная свекла	Качество листьев, эффективность азота, сопротивляемость болезням	1-2 раза 1-3 л/га	с фазы 6-го листа
Овощные	Фотосинтез, внутреннее качество, жизнеспособность, сопротивляемость болезням	1-4 раза 2-5 л/га	при формировании достаточной площади листьев